

MARZO 2024


UN FANZINE DE GLORIA G. BERDUGO
AKA

@antropo.cosas

UNA RECOPILOCIÓN
DE LAS PERIPECIAS
MÉDICAS QUE HE
VIVIDO EN LOS
ÚLTIMOS MESES

O

MI CUERPO
CONTRA
MÍ



HE 2100
70002
20123
20123

FIN.

DEDICADO A
TODAS LAS
PERSONAS QUE
ME CUIDARON

LUCÍA, PAULA, JUAN
MAMÁ

A LA PARTI*
SOBRE TODO A
LUCÍA QUE PILLÓ
COVID X MI
CULPA

Servicio Andaluz de S

Se le avisará por el código

J7B8

24/10/2023 14:16

Diríjase a: **OCTUBRE**
SALA ESPERA
ALAMILLO

Servicio Andaluz de Salud

Se le avisará por el código

Z3V9

24/10/2023 13:53

Diríjase a: **OCTUBRE**
SALA ESPERA CAP
ALAMILLO

Servicio Andaluz de Sa

Se le avisará por el código

M3S3

14/12/2023 09:11

Diríjase a: **DICIEMBRE**
SALA ESPERA
ALAMILLO

Servicio Andaluz de Salud

Se le avisará por el código

D7D6

22/11/2023 08:05

Diríjase a: **NOVIEMBRE**
SALA ESPERA CAP
ALAMILLO

Servicio Andaluz de Salud

Se le avisará por el código

S7K8

15/11/2023 08:49

Diríjase a:
SALA ESPERA CAP
ALAMILLO

**ENTRAS. VAS A
LA MÁQUINA. TECLEAS
TU DNI Y EL MOTIVO
DE TU CITA. SE
IMPRIHE UN PAPEL.**

**TE SIENTAS Y
ESPERAS. MIRAS**

**LA PANTALLA HASTA QUE SALE
TU NÚMERO. VAS Y DICES LO QUE
QUIERES**



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

U.G.C. ANATOMÍA PATOLÓGICA

VM - HOSPITAL VIRGEN MACARENA

Avda. Dr. Fedriani Nº 3.

41009 - SEVILLA

APRECIO MUCHO MÁS
PODER
RESPIRAR POR
LA NARIZ

INFORME DE ALTA DE URGENCIA

Hospital Virgen Macarena - Servicio de Urgencias Obstétrico-Ginecológicas

ASÍ ES,
TAMBIÉN TENGO PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES. ES QUE
TENGO MUCHOS SENTIMIENTOS

MEDICAMENTO SUJETO A
PRESCRIPCIÓN MÉDICA.
Mantener fuera de la vista y del
alcance de los niños.
Leer el prospecto antes de utilizar
este medicamento.

A.S.S.S.
TARBIS FARMA, S.L.
Omeprazol Tarbis 20 mg
28 cápsulas duras gastroresistentes EFG
C.N. 732554

8 470007 1325543

Tarbis Farma S.L.
Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona
España

732554.3 O

**Omeprazol
Tarbis 20 mg**
cápsulas duras
gastroresistentes EFG

Vía oral.
28 cápsulas gastroresistentes

TARBIS

HE SIDO
TODOS
ESTOS
NÚMEROS

ESTOS
SON LOS
QUE HE GUARDADO
¿QUIÉN SABE SI HAY
MÁS?

C.S. Alamillo

CONSULTA 24-MF

LIMON FERNANDEZ, ANGELA M

Fecha: 30/11/2023 Hora: 03:41 Orden: 4

Consulta de medicina familia

Demanda clínica

Usuario: GALAN BERDUGO, GLORIA

Nº de S.S.: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Firma y Sello

Hora de salida:

Justific.: Acceso Demanda Asistencia

Acuda 5 min antes de la cita, guarde distancia seguridad

Servicio Andaluz de S.
Se le avisará por el código

Z3E3

URG.T

07/12/2023 16:44



Z3, 1.



Prospecto: información para el usuario

Enantyum 25 mg comprimidos recubiertos con película dextketoprofeno

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- **Conserve este prospecto**, ya que puede tener que volver a leerlo. ✓
- Si tiene alguna duda, consulte a su **médico o farmacéutico**.
- Este medicamento se le ha recetado **únicamente a usted y no debe dárselo a otras personas** aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su **médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto**. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Enantyum y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Enantyum
3. Cómo tomar Enantyum
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Enantyum
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Enantyum y para qué se utiliza

Enantyum es un analgésico perteneciente al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se utiliza para tratar el dolor de intensidad leve o moderada, tal como dolor de tipo muscular o de las articulaciones, dolor menstrual (dismenorrea), dolor dental.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Enantyum

No tome Enantyum:

- Si es alérgico a dextketoprofeno o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6);
- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico o a otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo;
- Si tiene asma o ha sufrido ataques de asma, rinitis alérgica aguda (un período corto de inflamación de la mucosa de la nariz), pólipos nasales (formaciones carnosas en el interior de la nariz debido a la alergia), urticaria (erupción en la piel), angioedema (hinchazón de la cara, ojos, labios o lengua, o dificultad para respirar) o sibilancias en el pecho tras haber tomado ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos;
- Si ha sufrido reacciones fotoalérgicas o fototóxicas (forma especial de enrojecimiento o de quemaduras de la piel expuesta a la luz solar) durante la toma de ketoprofeno (un antiinflamatorio, no esteroideo) o fibratos (medicamentos usados para reducir los niveles de grasas en sangre);
- Si tiene úlcera péptica, hemorragia de estómago o de intestino o si ha sufrido en el pasado hemorragia, ulceración o perforación de estómago o de intestino;
- Si tiene problemas digestivos crónicos (p. ej. indigestión, ardor de estómago);
- Si ha sufrido en el pasado hemorragia de estómago o de intestino o perforación, debido al uso previo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) utilizados para el dolor;
- Si tiene enfermedad inflamatoria crónica del intestino (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa);
- Si tiene insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia renal moderada a grave o insuficiencia hepática grave;
- Si tiene trastornos hemorrágicos o trastornos de la coagulación de la sangre;
- Si está gravemente deshidratado (ha perdido mucho líquido corporal) debido a vómitos, diarrea o consumo insuficiente de líquidos;
- Si está en el tercer trimestre de embarazo o dando el pecho;

NO CREG EN LA

PROPIEDAD PRIVADA



cumlaude lab:

HIDRATANTE EXTERNO

cumlaude lab:

HIDRATANTE EXTERNO

P.V.P.

11'05 €

CREMA

HIDRATANTE DE GENITALES EXTERNOS
Test bajo control pediátrico y ginecológico

EXTERNAL GENITAL MOISTURIZER
Tested under pediatric and gynecological control

30ml e / 1.01 fl. oz.

INFORME DE ASISTENCIA A CONSULTA

PONE CUM XD

ESTA FUE UNA DE LAS COSAS MÁS CARAS QUE COMPRÉ Y NO SIRVIÓ PARA NADA



Canestén® 10 mg/g
crema

clotrimazol

Crema

88325931

NO HAY LUGAR
MÁS LLENO DE
DESESPERACIÓN QUE
EL CORAZÓN DE UNA
CHICA A LA QUE
LE PICA EL XOXO

anginetten®

HALSTABLETTEN

zuckerfrei

Bei Halsschmerzen und akuten
Entzündungen in Hals und Rachen

Zur unterstützenden Behandlung bei
Entzündungen der Rachen-
schleimhaut, die mit typischen
Symptomen wie Halsschmerzen,
Rötung oder Schwellung einhergehen.



24

Lutschtabletten
Honig-Zitrone

ARZNEIMITTEL

Ch.-B.:
Verwendbar bis:

03/2019

ME DUELE LA GARGANTA DE REPETIR
TODOS LOS DÍAS LO QUE ME PASA.
A MÉDICOS. A AUXILIARES. A PROFESIONALES.
A MIS AMIGAS. A MI MADRE. A CHAMANES.

ESTO NO ME ACUERDO QUÉ ERA

Azitromicina Aurovitas 500 mg
comprimidos recubiertos con película EFG

713582.1 0

Azitromicina Aurovitas 500 mg
comprimidos recubiertos con
película EFG

Via oral



3 comprimidos recubiertos con película AUROVITAS



HE ESTADO
2 VECES EN
EL HOSPITAL
DE LA MACARENA.
DE ACOMPAÑANTE.

ESTA FUE MI
PRIMERA COMO
PACIENTE



ME ENCANTA ESTE PARACETAMOL.
MIS AMIGAS DICEN QUE ESTÁ
ASQUEROSO



Nombre: GLORIA
Apellidos: GALAN BERDUGO

AN0913492346

F. Nec: 05/08/2002

Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse
Servicio Andaluz de salud Conse



INTENTÉ
SOLUCIONAR
TODOS MIS
PROBLEMAS
CON MICRODOSIS





Me he
resfriado
mucho... UNA

DE ESAS VECES FUE COVID

Contenido del prospecto:

1. Qué es Omeprazol Tarbis y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Omeprazol Tarbis
3. Cómo tomar Omeprazol Tarbis
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Omeprazol Tarbis
6. Contenido del envase e información adicional



apiretal® 500 mg
comprimidos bucodispersables

apiretal® 500 mg
comprimidos bucodispersables



paracetamol

12 comprimidos bucodispersables

Vía oral



ERN

Frenadol[®] Complex

granulado para solución oral
Paracetamol, Dextrometorfano, Clorfenamina, Cafeína, Ácido ascórbico

760017.6

Alivio sintomático de los
catarros y gripes que cursan con:

- ✓ Dolor leve o moderado como dolor de cabeza
- ✓ Tos improductiva (tos irritativa, tos nerviosa)
- ✓ Fiebre
- ✓ Secreción nasal
- ✓ Estornudos

10 Sobres
Sabor naranja

Para adultos y adolescentes a partir de 14 años.

SON LO MISMO SALVO QUE
EL NORMO GRIP NO SABE A
PUTA MIERDA

normogrip

granulado para solución oral

paracetamol/clorfenamina maleato/fenilefrina hidrocloreto

Alivio sintomático de los procesos catarrales
y gripales que cursan con:

- Fiebre
- Dolor leve o moderado
- Secreción nasal

Para adultos y adolescentes a partir de 14 años.



10 sobres
Granulado para solución oral
Vía oral

716425.8

NORMON

Canestén 10 mg/g crema

Clotrimazol

Lea todo el prospecto detenidamente
antes de empezar a usar este
medicamento, porque contiene
información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico, o enfermero.
- Este medicamento ~~se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque presenten los mismos síntomas de enfermedad que usted, ya que puede perjudicarlos.~~
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. (Ver sección 4)

Contenido del prospecto:

1. Qué es Canestén y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Canestén
3. Cómo usar Canestén
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Canestén
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Canestén y para qué se utiliza

El clotrimazol es un antifúngico (medicamento que se emplea para tratar las infecciones producidas por hongos).

Este medicamento está indicado en el tratamiento de las infecciones superficiales de

Embarazo

No se esperan riesgos para la madre y el niño después del uso tópico de clotrimazol durante el embarazo, no obstante, el médico evaluará el beneficio de la utilización del medicamento antes de ser administrado.

Lactancia

El clotrimazol puede utilizarse durante la lactancia. Si se utiliza de forma tópica en la zona del pezón, lavar bien la zona antes de alimentar al niño.

Conducción y uso de máquinas

La influencia de Canestén sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Canestén contiene alcohol cetosteárilico y alcohol bencilico

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárilico.

Este medicamento contiene 20 mg de alcohol bencilico en cada gramo.

El alcohol bencilico puede provocar reacciones alérgicas.

El alcohol bencilico puede provocar irritación local moderada.

3. Cómo usar Canestén

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico o enfermero. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

HEMATOLOGÍA General

-Hemograma completo

BIOQUÍMICA General (sangre)

-Glucosa

-Proteínas totales

-Urea

-Creatinina

-Filtrado glomerular/1,73 m² (estimado)

-Colesterol

-Triglicéridos

-Alanina transaminasa

-Sodio

-Potasio

PROTEÍNAS ESPECÍFICAS (SANGRE)

-Hemoglobina glicosilada (A1c)

HORMONAS (SANGRE)

-Tirotopina

URIANÁLISIS

-Sistemático de orina

BIOQUÍMICA GENERAL (ORINA)

-Albúmina/Creatinina (orina)

INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (bacterias)

-Treponema pallidum, Ac

INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO (virus)

-Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2, Ac+Ag p24

-Virus de la hepatitis A, Ac

-Virus de la hepatitis A, Ac(IgM)

-Virus de la hepatitis B (Ag s), Ac (cuantificación; UI)

-Virus de la hepatitis B, Ag s

-Virus de la hepatitis C, Ac

MICROBIOLOGÍA (cultivo y microscopía)

-Exudado vaginal: Cultivo de bacterias+hongos

MICROBIOLOGIA Molecular (otras muestras)

-Chlamydia trachomatis, detección ADN (ex. vaginal)

-Mycoplasma genitalium, detección ADN (ex. vaginal)

-Neisseria gonorrhoeae, detección ADN (ex. vaginal)

MIS ANALÍTICAS ESTÁN SIEMPRE PERFECTAS

* AUNQUE TENGO EL SODIO UN POCO ALTO



Espécimen
Sangre
Sangre
Orina
Sangre



INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA : CITOLOGÍA

